

Dorithricin[®]

таблетки от боли в горле «Классик»



Инструкция по применению: Информация для пользователей

Dorithricin[®] таблетки от боли в горле «Классик» 0,5 мг / 1,0 мг / 1,5 мг, сосательные таблетки
Действующие вещества: тиротрицин / бензалкония хлорид / бензокаин

Внимательно прочтите всю инструкцию по применению, прежде чем начать применение данного лекарственного средства, поскольку в ней содержится важная информация.

Принимайте данный лекарственный препарат всегда в соответствии с рекомендациями, содержащимися в данной инструкции по применению, или в строгом соответствии с предписаниями Вашего врача или фармацевта.

- Сохраните инструкцию по применению. Возможно, Вам захочется позже прочитать ее еще раз.
- Обратитесь к Вашему фармацевту, если Вам понадобится дальнейшая информация или совет.
- Если Вы обнаружите побочные эффекты, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это касается также тех побочных эффектов, которые не указаны в данной инструкции по применению. См. раздел 4.
- Если через 2 дня Вы не заметите улучшений или даже почувствуете себя хуже, обратитесь к своему врачу.

Что содержится в данной инструкции по применению

1. Что представляют собой Dorithricin[®] таблетки от боли в горле «Классик», и с какой целью они применяются?
2. На что следует обратить внимание перед приемом Dorithricin[®] таблеток от боли в горле «Классик»?
3. Как следует принимать Dorithricin[®] таблетки от боли в горле «Классик»?
4. Какие побочные эффекты могут наблюдаться?
5. Как следует хранить Dorithricin[®] таблетки от боли в горле «Классик»?
6. Содержимое упаковки и дальнейшая информация

1. Что представляют собой Dorithricin[®] таблетки от боли в горле «Классик», и с какой целью они применяются?

Dorithricin[®] таблетки от боли в горле «Классик» представляют собой лекарственное средство для лечения полости рта и глотки.

Показания к применению

Для симптоматического лечения инфекций полости рта и глотки, сопровождающихся болью в горле и затрудненным глотанием.

2. На что следует обратить внимание перед приемом Dorithricin[®] таблеток от боли в горле «Классик»?

Dorithricin[®] таблетки от боли в горле «Классик» нельзя принимать

- если у Вас имеется аллергия на тиротрицин, бензалкония хлорид, бензокаин или на одно из вспомогательных веществ, содержащихся в Dorithricin[®] таблетках от боли в горле «Классик» и перечисленных в разделе 6.

Предостережения и меры предосторожности

При тяжелых ангинах или боли в горле, сопровождающейся высокой температурой, головной болью, тошнотой или рвотой, следует обратиться за консультацией к врачу.

В особенности при гнойных воспалениях миндалин с высокой температурой врач решает, можете ли Вы принимать Dorithricin[®] таблетки от боли в горле «Классик» наряду с другими видами лечения, например, приемом антибиотиков.

При наличии свежих ран в полости рта и глотки следует отказаться от приема Dorithricin[®] таблеток от боли в горле «Классик».

Пациентам со склонностью к реакциям повышенной чувствительности кожи (аллергической контактной экземой) следует избегать приема Dorithricin[®] таблеток от боли в горле «Классик», так как возможны реакции повышенной чувствительности.

Дети



Поскольку невозможно гарантировать соответствующий способ применения (сосание) у младенцев и маленьких детей, Dorithricin® таблетки от боли в горле «Классик» непригодны для применения у младенцев и маленьких детей (до 24 месяцев).

При применении у детей следует обращать внимание на то, чтобы у них уже был развит навык контролируемого сосания.

Прием Dorithricin® таблеток от боли в горле «Классик» вместе с другими лекарственными средствами

Проинформируйте своего врача или фармацевта, если Вы принимаете другие лекарственные средства, недавно принимали другие лекарственные средства или собираетесь принимать другие лекарственные средства.

При использовании согласно предписанию никаких взаимодействий с другими лекарственными средствами до сих пор отмечено не было.

Беременность и кормление грудью

До сих пор не было выявлено каких-либо вредных воздействий на плод со стороны Dorithricin® таблеток от боли в горле «Классик». Однако из соображений предосторожности их прием во время беременности и грудного вскармливания должен производиться только после консультации с Вашим врачом или фармацевтом.

Dorithricin® таблетки от боли в горле «Классик» содержат сорбитол

Принимайте Dorithricin® таблетки от боли в горле «Классик» только после консультации со своим врачом, если Вам известно, что Вы страдаете непереносимостью определенных видов сахара.

Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать Dorithricin® таблетки от боли в горле «Классик».

Информация для диабетиков

1 таблетка для сосания содержит 0,87 г сорбитола (источник 0,22 г фруктозы) и соответствует прим. 0,07 хлебных единиц (ХЕ). Сорбитол может оказывать легкое слабительное действие.

3. Как следует принимать Dorithricin® таблетки от боли в горле «Классик»?

Принимайте данное лекарственное средство всегда в строгом соответствии с тем, как это указано в данной инструкции по применению или согласно рекомендациям Вашего врача или фармацевта. Обратитесь за консультацией к своему врачу или фармацевту, если у Вас есть какие-либо сомнения.

Рекомендованная доза составляет

По необходимости медленно рассасывайте 1 -2 таблетки для сосания несколько раз в день, каждые 2 - 3 часа.

После улучшения самочувствия лечение следует продолжать в течение еще одного дня.

Если Вы приняли большее количество Dorithricin® таблеток от боли в горле «Классик», чем следует

При правильном применении отравление Dorithricin® таблетками от боли в горле «Классик» невозможно и до сих пор не наблюдалось.

После приема очень большого количества таблеток могут возникнуть нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, а также, в особенности у детей, повышенное содержание метгемоглобина в крови. Возможными признаками этого являются одышка и синюшность губ и пальцев рук.

При подозрении на значительную передозировку проинформируйте об этом врача.

В качестве ответных мер рекомендуется прием достаточного количества воды и таблеток активированного угля, а также при необходимости принятие врачом соответствующих мер против метгемоглобинемии.

Если Вы забыли принять Dorithricin® таблетки от боли в горле «Классик»

Не принимайте двойную дозу препарата, если Вы пропустили предыдущий прием.

Сразу пососите 1 таблетку Dorithricin® от боли в горле «Классик» и далее продолжайте прием в обычной дозировке.

4. Какие побочные эффекты могут наблюдаться?

Как все лекарственные препараты данное лекарственное средство также может иметь побочные эффекты, которые, однако, не обязательно должны проявиться у каждого пациента.

При оценке частоты возникновения побочных эффектов за основу брались следующие показатели:

- Очень часто: более чем 1 пациент из 10
- Часто: от 1 до 10 пациентов из 100



- Иногда: от 1 до 10 пациентов из 1.000
- Редко: от 1 до 10 пациентов из 10.000
- Очень редко: менее чем 1 пациент из 10.000
- Неизвестно: Частоту невозможно оценить на основе имеющихся данных

Возможные побочные эффекты

Редко:

В редких случаях возможны реакции повышенной чувствительности, в особенности на продукт распада бензокаина (эфир аминобензойной кислоты).

При наружном применении, в особенности у детей и при нанесении на большие раневые поверхности, отмечалось повышенное содержание метгемоглобина в крови. Возможными признаками этого являются одышка и синюшность губ и пальцев рук.

Частота неизвестна:

У чувствительных пациентов могут также возникать аллергические реакции на вещества, которые находятся в химическом родстве с бензокаином, такие как, например, пенициллины, сульфаниламиды, косметические средства для защиты от солнца, п-аминосалициловую кислоту (парагрупповая сенсibilизация).

Другие возможные побочные эффекты

У соответственно сенсibilизированных пациентов могут возникнуть реакции повышенной чувствительности на мятное масло (включая одышку).

Сообщение о побочных эффектах

Если Вы заметите побочные эффекты, обратитесь к своему врачу или фармацевту. Это касается также и тех побочных эффектов, которые не указаны в данной инструкции по применению. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через национальную информационную систему.

для Германии:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
вебсайт: <http://www.bfarm.de>

для Люксембурга

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
вебсайт: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Ваши сообщения о побочных эффектах будут способствовать сбору дополнительной информации о безопасности данного лекарственного средства.

5. Как следует хранить Dorithricin® таблетки от боли в горле «Классик»?

Храните данное лекарственное средство в месте, недоступном для детей.

Нельзя использовать данное лекарственное средство после истечения срока годности – даты «Verwendbar bis:», указанной на картонной коробке и упаковке. Дата окончания срока годности – последний день указанного месяца.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Не выбрасывайте лекарственные средства в сточные воды или бытовые отходы. Спросите у Вашего фармацевта, как следует утилизировать лекарственное средство, если Вы его больше не используете. Тем самым Вы внесете свой вклад в защиту окружающей среды.

6. Содержимое упаковки и дальнейшая информация

Что содержится в Dorithricin® таблетках от боли в горле «Классик»

- Действующими веществами являются:
1 таблетка для сосания:
Тиротрицин 0,5 мг
Бензалкония хлорид 1,0 мг
Бензокаин 1,5 мг
- Вспомогательными веществами являются:
Сорбитол (Ph. Eur.), тальк, сахарозы стеарат тип III, сахаринат натрия 2 H₂O, мятное масло, повидон (K 25), кармеллоза натрия (Ph. Eur.)



Как выглядят Dorithricin® таблетки от боли в горле «Классик» и содержимое упаковки

Белые, круглые таблетки

Упаковки с 20 таблетками для сосания и 40 таблетками для сосания

Держатель регистрационного удостоверения

MEDICE Pharma GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

Телефон: (02371) 152790

Факс: (02371) 937-329

е-мейл: info@medice-pharma.de

Производитель и со-дистрибьютор

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

Факс: (02371) 937-0

Telefax: (02371) 937-329

е-мейл: info@medice.de

www.medice.de

Данная инструкция по применению была переработана в последний раз в апреле 2015.

Неофициальный перевод немецкого листка-вкладыша.