

Dorithricin®

Boğaz Tableti Klasik



Kullanma Talimatı: Kullanıcılar için bilgiler

Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik 0,5 mg / 1,0 mg / 1,5 mg pastil

Etkin maddeler: tirotrisin / benzalkonyum klorür / benzokain

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce ambalaj prospektüsünün tümünü dikkatlice okuyunuz, çünkü önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı daima aynen ambalaj prospektüsünde belirtildiği gibi ya da aynen doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarına göre alınız.

- Ambalaj prospektüsünü saklayınız. Belki onu daha sonra tekrar okumak isteyebilirsiniz.
- Daha fazla bilgiye veya bir tavsiyeye ihtiyacınız olursa, eczacınıza sorunuz.
- Eğer yan etkiler fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu ambalaj prospektüsünde belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Bakınız Bölüm 4.
- Eğer 2 gün sonra kendinizi iyi hissetmezseniz ya da hatta daha kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Bu ambalaj prospektüsünün içeriği

1. Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik nedir ve ne için kullanılır?
2. Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik'i kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
3. Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nelerdir?
5. Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik nasıl saklanır?
6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

1. Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik nedir ve ne için kullanılır?

Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik boğaz ve yutak tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Uygulama alanı

Boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü eşliğinde seyreden ağız ve yutak bölgesi enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi

2. Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik'i kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik'i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız

- eğer tirotrisin, benzalkonyum klorür, benzokain veya Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik'in Bölüm 6'da belirtilen diğer bileşenlerinden birine karşı alerjiniz varsa, kullanmayınız.

Uyarı ve önlemler

Yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı veya kusma eşliğinde seyreden ağır boğaz iltihaplarında veya boğaz ağrılarında bir doktora danışmalısınız.

Doktorunuz özellikle ateşli ve cerahatli bir bademcik iltihabında, örneğin antibiyotik tedavisi gibi diğer tedavi önlemlerinin yanı sıra Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik'i de kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Ağız ve yutak bölgesinde taze yaralar olması durumunda Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik kullanımından kaçınılmalıdır.

Ciltte aşırı duyarlılık (alerjik temas egzaması) eğilimi olan hastalar Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik kullanımından kaçınılmalıdırlar, çünkü ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarına yol açabilir.

Çocuklar

Bebeklerin ve küçük çocukların ilacı gerektiği gibi kullanması (emerek ağızda eritme) garanti edilemeyeceğinden, Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik'in bebeklerde ve 24 ayın altındaki küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir.

Çocuklarda uygulanırken, çocuğun pastili kontrollü bir şekilde emerek ağızda eritme yeteneğini kazanmış olduğuna dikkat edilmelidir.

Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik'in diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer başka ilaçlar alıyorsanız, ya da kısa bir süre önce başka ilaçlar aldıysanız, ya da başka ilaçlar almak niyetindeyseniz, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirin.

Şu ana kadar, amaca uygun bir şekilde kullanıldığında diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşimi bilinmemektedir.



Hamilelik ve emzirme dönemi

Şu ana kadar Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik'in teratojenik etkisi olduğuna dair bir bilgi yoktur. Yine de, hamilelik ve emzirme dönemlerinde ilacı kullanmadan önce ihtiyaten doktorunuza veya eczacınıza danışmakta yarar vardır.

Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik sorbitol içerir

Eğer belli şekerlere karşı toleranssızlık şikayetiniz olduğuna biliyorsanız, lütfen Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik almadan önce doktorunuza danışınız.

Nadir görülen kalıtsal fruktoz intoleransından şikayetçi olan hastalar Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik almamalıdır.

Diyabetliler için bilgiler

1 pastil, yaklaşık 0,07 ekmek birimine (EB) denk gelen 0,87 g sorbitol (0,22 g fruktoz oluşturur) içerir. Sorbitol hafif bir müshil etkisi gösterebilir.

3. Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik nasıl kullanılır?

Bu ilacı daima aynen ambalaj prospektüsünde belirtildiği gibi ya da aynen doktorunuzla veya eczacınızla kararlaştırdığınız şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önerilen doz

İhtiyaca göre günde birkaç defa, 2 - 3 saatte bir 1 - 2 pastili yavaş yavaş ağızınızda eritin.

Şikayetler sona erdikten sonra tedaviye bir gün daha devam edilmelidir.

Kullanmanız gerektiğinden daha fazla miktarda Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik almışsanız

Gerektiği gibi kullanıldığında, Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik ile zehirlenmek söz konusu olmayıp, şimdiye kadar da böyle bir olay bildirilmemiştir.

Çok fazla sayıda tablet alınması durumunda mide-bağırsak şikayetleri ve, özellikle çocuklarda olmak üzere, kanda artan miktarda methemoglobin görülebilir. Bunun olası belirtileri nefes darlığı ve dudakların ve parmakların morarmasıdır.

Önemli ölçüde bir doz aşımı şüphesi varsa, lütfen bir doktora haber veriniz.

Karşı önlem olarak bol su içilmesi ve kömür tableti alınması, ve duruma göre doktor tarafından methemoglobinemiye karşı alınacak önlemler önerilmektedir.

Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik almayı unutursanız

Bir önceki ilaç alımını atladıysanız, çift miktarda ilaç almayın.

Hemen 1 adet Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik pastilini ağızınızda eriterek alın ve ardından her zamanki dozunuzla devam edin.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilacın da yan etkileri olabilir, ancak bunların herkeste ortaya çıkması şart değildir.

Yan etkilerin değerlendirilmesinde şu sıklık kriterleri temel alınmaktadır:

- Çok yaygın: tedavi edilen her 10 kişide birden fazla
- Yaygın: tedavi edilen her 100 kişide 1 ila 10 arasında
- Yaygın olmayan: tedavi edilen her 1.000 kişide 1 ila 10 arasında
- Nadir: tedavi edilen her 10.000 kişide 1 ila 10 arasında
- Çok nadir: tedavi edilen her 10.000 kişide birden az
- Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle yaygınlık konusunda bir tahminde bulunmak mümkün değil

Olası yan etkiler

Nadir:

Nadir olarak, başta benzokainin bir yıkım ürünü olan aminobenzoik asit estere karşı olmak üzere, aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir.

Dıştan uygulamalarda, özellikle çocuklarda ve büyük yara yüzeylerine sürüldüğünde, kanda methemoglobin düzeyinde artış görülmüştür. Bunun olası belirtileri nefes darlığı ve dudakların ve parmakların morarmasıdır.

Yaygınlığı bilinmiyor:

Duyarlı hastalarda, penisilinler, sülfonamidler, güneşten koruyucu kozmetikler, p-amino salisilik asit gibi kimyasal açıdan benzokain ile benzeşen maddeler de alerjik reaksiyonlara yol açabilir (para grubu sensibilizasyonu)

Diğer olası yan etkileri

Nane yağı, bu maddeye karşı hassaslaşmış hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (nefes darlığı dahil) yol açabilir.



Yan etki bildirimi

Eğer yan etkiler fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu ambalaj prospektüsünde belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Yan etkileri ulusal bildirim sistemi üzerinden de bildirebilirsiniz.

Almanya için:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü)
Abt. Pharmakovigilanz (Farmakovijilans Bölümü)
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
İnternet adresi: <http://www.bfarm.de>

Lüksemburg için:

Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments (Sağlık Direktörlüğü - Eczacılık ve İlaç Bölümü)
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
İnternet adresi: <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Yan etkileri bildirerek bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlamış olursunuz.

5. Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik nasıl saklanır?

Bu ilacı çocukların görmeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Bu ilacı ambalaj kartonunun ve kabın üzerinde "Verwendbar bis:" olarak belirtilen tarihten sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününe denk gelir.

Saklama koşulları

25 °C'nin üzerinde saklamayınız.

İlaçları kanalizasyona veya çöpe atarak gidermeyiniz. Kullanmadığınız ilaçları nasıl gidereceğinizi öğrenmek için eczacınıza danışınız. Böylece çevreyi korumaya katkıda bulunmuş olacaksınız.

6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik neler içerir?

- Etkin maddeleri:
1 pastilin içeriği:
Tirotrisin 0,5 mg
Benzalkonyum klorür 1,0 mg
Benzokain 1,5 mg
- Yardımcı maddeler şunlardır:
Sorbitol (Ph. Eur.), talkum, sükroz stearat Tip III, sakkarin sodyum 2 H₂O, nane yağı, povidon (K 25), karmeloz sodyum (Ph. Eur.)

Dorithricin® Boğaz Tableti Klasik'in görünüşü ve ambalajın içeriği:

Beyaz, yuvarlak tabletler

20 pastil ve 40 pastil içeren ambalajlar halinde

Ruhsat sahibi

MEDICE Pharma GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn
Telefon: (02371) 152790
Faks: (0371) 937-329
E-posta: info@medice-pharma.de

Üretici ve eş pazarlayıcı

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn
Telefon: +49 (0)2371 937-0
Faks: +49 (0)2371 937-329
E-posta: info@medice.de
www.medice.de

Bu ambalaj prospektüsünün son olarak düzenlendiği tarih: Nisan 2015.

Almanca dilindeki kullanma talimatının resmi olmayan tercümesi.

