

Dorithricin®

أقرص للحلق بطعم التوت

معلومات الاستخدام: معلومات للمستخدم

دوريثريسين® أقرص للحلق بطعم التوت 0,5 ملغم / 1,0 ملغم / 1,5 ملغم، أقرص استحلاب
المواد الفعالة: تيروثريسين / كلوريد البنزوكونيوم / بنزوكاين

الرجاء قراءة سائر النشرة المرفقة بالعبوة بعناية قبل البدء في تناول هذا العقار، لأنها تتضمن معلومات هامة.

استخدم هذا العقار الدوائي دائماً بدقة كما هو موصوف في النشرة المرفقة أو تبعاً لتعليمات الطبيب أو الصيدلي.

- الرجاء الاحتفاظ بنشرة العبوة. ربما ترغب في قراءتها مرة أخرى في وقت لاحق.
- قم بالاستفسار لدى الصيدلي، إذا كنت تحتاج إلى معلومات أخرى أو لنصيحة.
- إذا لاحظت أعراض جانبية، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي. يسري هذا أيضاً على الأعراض الجانبية الغير مذكورة في هذه النشرة. أنظر مقطع 4.
- إذا لم تتحسن الأعراض الجانبية بعد يومين أو أحسست بسوء حالتك يرجى التوجه إلى طبيبك.

ماذا يوجد في هذه النشرة

1. ماهي أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت ولما يتم استخدامها؟
2. مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت؟
3. كيف يتم تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت؟
4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
5. كيف يتم حفظ أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت؟
6. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

1. ماهي أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت وفيما يتم استخدامها؟

أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت هي عقار دوائي للفم والحلق.

موضع الاستخدام

لعلاج أعراض التهابات الفم ومنطقة الحلق المصحوبة بالآلام للحلق وصعوبة في البلع.

2. مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت؟

يحظر تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت

- إذا كان لديك حساسية ضد تيروثريسين أو كلوريد بنزوكونيوم أو بنزوكاين أو أحد مكونات أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت الأخرى المذكورة في المقطع 6.

التحذيرات والإجراءات الوقائية

في حالة الالتهابات الحادة للحلق أو آلام الحلق المصحوبة بارتفاع عالي لدرجة الحرارة أو الصداع أو الغثيان أو القيء، ينبغي استشارة الطبيب.
وعلى الأخص في حالة التهابات اللوز المتقيحة مع الحمى يقرر طبيبك عما إذا كان من الممكن أن تتناول إضافياً أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت إلى جانب إجراءات العلاج الأخرى مثل مضاد حيوي.

في حالة الجروح الحديثة في الفم ومنطقة الحلق ينبغي التخلي عن تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت.

المرضى الذين لديهم ميول إلى ردود فعل حساسية على الجلد (أكزيما أرجية) ينبغي عليهم تجنب تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت، لأنه من المحتمل حدوث ردود فعل حساسية.

الأطفال

لأن أسلوب الاستخدام الصحيح (الاستحلاب) لدى الأطفال الرضع والأطفال الصغار غير مضمون، فإن أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت غير مناسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 24 شهراً.

في حالة الاستخدام لدى الأطفال ينبغي مراعاة، أن يكونوا هؤلاء قد اكتسبوا بالفعل قدرة الامتصاص بشكل يمكن التحكم فيه.

تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت مع عقاقير دوائية أخرى

إذا كنت تتناول عقاقير دوائية أخرى، يجب أن تخبر طبيبك أو الصيدلي، بأنك تناولت قبل فترة قصيرة عقار دوائي آخر أو لديك النية لتناول عقار دوائي آخر.

في حالة الاستخدام تبعاً للتعليمات لا يعرف حتى الآن أعراض جانبية ناجمة عن التناول مع العقاقير الدوائية الأخرى.

فترة الحمل والرضاعة

حتى الآن لم تظهر علامات على حدوث آثار مضره للخصوبة من خلال تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت. إلا أنه بالرغم من ذلك ينبغي أن يتم تناول خلال فترة الحمل والرضاعة للاحتياط بعد استشارة طبيبك أو الصيدلي فقط.

أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت تحتوي على سوربيتول

الرجاء تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت بعد استشارة طبيبك فقط، إذا كان من المعروف لك، إنك تعاني من عدم تحمل أنواع محددة من السكريات.

ينبغي على المرضى الذي يعانون من عدم التحمل الوراثي للفركتوز عدم تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت.

إرشاد لمرضى السكر

قرص استحلاب واحد يحتوي على 0,86 غم سوربيتول (مصدر لـ 0,22 غم فركتوز) هذا يطابق حوالي 0,07 وحدة خبز. سوربيتول يمكن أن يؤدي إلى الإسهال الخفيف.

3. كيف يتم تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت؟

تناول هذا العقار الدوائي دائماً بدقة كما هو موصوف في النشرة أو تبعاً للاتفاق المتفق عليه مع طبيبك أو الصيدلي. قم بالاستعلام لدى طبيبك أو الصيدلي، إذا لم تكن متأكد تماماً.

الجرعة المنصوح بها تبلغ

دع في الفم 1 - 2 قرص استحلاب كل 2 - 3 ساعات عدة مرات يومياً وتبعاً للحاجة واتركه يذوب بشكل بطيء في الفم.

يجب الاستمرار في تناول العلاج لمدة يوم بعد هدوء الشكوى.

إذا كنت قد تناولت أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت بكمية أكبر من المقرر

في حالة الاستخدام تبعاً للتعليمات يجب استبعاد حدوث تسمم من جراء تناول أقرص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت وهذا غير معروف أيضاً حتى الآن. بعد تناول عدد كبير جداً من الأقرص قد تحدث آلام في المعدة والأمعاء وكذلك على الأخص لدى الأطفال قد يحدث ارتفاع نسبة ميثيموغلوبين في الدم. الأعراض المحتملة هي صعوبة التنفس وتلون الشفاه والأصابع باللون الأزرق.



في حالة الشك في تناول جرعة كبيرة يرجى إخبار الطبيب بذلك.
كإجراء مضاد ينصح بتناول كمية غزيرة من الماء وأقراص الفحم وفي حالة الضرورة يقوم الطبيب بإجراءات مناسبة ضد متهيموغلوبيين.

إذا نسيت تناول أقراص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت

لا تتناول جرعة مزدوجة، إذا كنت قد نسيت تناول الجرعة السابقة.

قم باستحلاب قرص من أقراص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت مباشرة واستمر في الاستخدام تبعاً للجرعة المعتادة.

4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال في جميع العقاقير الدوائية قد يكون لهذا العقار الدوائي أعراض جانبية أيضاً، لكن قد لا تظهر هذه الأعراض عند كل شخص.
في حالة تقييم الأعراض الجانبية تم ذلك على أساس بيانات التكرار التالية:

- غالباً جداً: أكثر من معالج من بين 10
- غالباً: 1 حتى 10 معالجون من بين 100
- أحياناً: 1 حتى 10 معالجون من بين 1000
- نادر: 1 حتى 10 معالجون من بين 10000
- نادر جداً: أقل من معالج من بين 10000
- غير معروف: لا يمكن تقدير التكرار على أساس البيانات المتوفرة.

الأعراض الجانبية المحتملة

نادرًا:

في حالات نادرة قد تحدث ردود أفعال حساسية، خاصة على منتج تحلل بنزوكاين (إستر حمض أمينوبنزو)

في حالة الاستخدام الخارجي، خاص لدى الأطفال في حالة وضعه على جروح كبيرة، تظهر ارتفاع نسبة متهيموغلوبيين في الدم. الأعراض المحتملة لذلك هي صعوبة التنفس وتلون الشفاه والأصابع باللون الأزرق.

التكرار غير معروف:

في حالة المرضى الذين يعانون من حساسية قد تحدث ردود فعل حساسية من خلال مواد لها علاقة قرابة كيميائية مع بنزوكاين، مثل بنسلين وسولفوناميد ومستحضرات التجميل والحماية من الشمس حامض أمينوساليسيل (حساسية المجموعات القريبة)

الأخطار عن الأعراض الجانبية

إذا لاحظت أعراض جانبية، فيرجى التوجه إلى طبيبك أو الصيدلي. يسري هذا أيضاً على الأعراض الجانبية الغير مذكورة في نشرة العبوة هذه. تستطيع أيضاً الإخطار عن الأعراض الجانبية مباشرة عن طريق استمارة الإخطار الخاصة بالأعراض الجانبية الغير مرغوب فيها للعقاقير الدوائية (UAW). (<http://www.bfarm.de>) في حالة الإخطار عن أعراض جانبية تستطيع أن تساهم في توفير معلومات أكثر عن أمن هذا العقار الدوائي.

5. كيف يتم حفظ أقراص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت؟

يحفظ هذا العقار الدوائي بعيد عن متناول الأطفال.

لا يجوز استخدام هذا العقار الدوائي بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المنكور على العبوة والوعاء بعد "يستخدم حتى". تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم في الشهر المذكور.

ظروف الحفظ:

لا يحفظ في درجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية.

لا تتخلص من العقار الدوائي في مياه الصرف أو القمامة المنزلية. استعلم لدى الصدلي الخاص بك كيف تتخلص من العقار الدوائي، إذا كنت لن تستخدمه بعد ذلك. بهذا تساهم في حماية البيئة.

6. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

ماذا تحتوي عليه أقراص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت

- المواد الفعالة هي:
قرص استحلاب يتضمن:
5,0 ملغم ثيروثريسين
1,0 ملغم كلوريد بنز الكونيوم
1,5 ملغم بنزوكاين

• المكونات الأخرى هي:
صوريبتول (الدستور الأوربي للأدوية)، التلك، إسترات سكروز طراز III، سكرين - صوديوم 2 H₂O، زيت نعناع، بوفيدون (K 25)، كراميلوزا - صوديوم (الدستور الأوربي للأدوية)

كيف تبدو أقراص الحلق دوريثريسين® بطعم التوت وما هو محتوى العبوة

أقراص بيضاء مستديرة

متوافر في عبوات بها 20 قرص استحلاب وعبوات بها 40 قرص استحلاب

الشركة صاحبة الترخيص

MEDICE Pharma GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

هاتف: 02371 152790

فاكس: 02371 937-329

البريد الإلكتروني: medice-pharma.deInfo@

الشركة المنتجة والمشاركة في التسويق

MEDICE Pharma GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

هاتف: 02371 937-0

فاكس: 02371 937-329

البريد الإلكتروني: info@medice.de

www.medice.de

هذه النشرة تم تعديلها مؤخراً في أبريل 2014

هذه ليست الترجمة الرسمية للنشرة الألمانية المرفقة بالعبوة

