

Dorithricin[®]

Pastiglie per la gola frutti di bosco



Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco 0,5 mg / 1,0 mg / 1,5 mg, pastiglie

Principi attivi: tirotricina / benzalconio cloruro / benzocaina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 2 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco e a cosa serve?
2. Cosa deve sapere prima di prendere Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco
3. Come prendere Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco e a cosa serve?

Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco è una medicina per la bocca e la gola.

Indicazione

Per il trattamento sintomatico in caso di infezioni della bocca e della gola accompagnate da mal di gola e disturbi della deglutizione.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco

Non prenda Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco

- se è allergico alla tirotricina, al benzalconio cloruro, alla benzocaina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco elencati al paragrafo 6.

Avvertenze e precauzioni

Chieda consiglio al medico in caso di infiammazioni gravi della gola o di mal di gola accompagnato da febbre alta, mal di testa, nausea o vomito.

In particolare in caso di tonsillite purulenta con febbre spetta al medico decidere se può usare Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco in aggiunta ad altre misure terapeutiche, come l'assunzione di antibiotici.

Eviti di usare Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco in caso di lesioni recenti in bocca o in gola.

I pazienti predisposti alle reazioni di ipersensibilità della pelle (eczema allergico da contatto) devono evitare di prendere Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco, perché possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità.

Bambini

Poiché nei lattanti e nei bambini piccoli l'uso corretto (scioglimento in bocca) non è garantito, Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco non è adatto ai lattanti e ai bambini sotto i 24 mesi di età.

Nei bambini occorre controllare che questi siano già in grado di succhiare le pastiglie in modo controllato.

Altri medicinali e Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco:

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In caso di uso corretto non sono finora note interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Finora non vi sono indizi di effetti nocivi sul feto da parte di Dorithricin[®] pastiglie per la gola frutti di bosco.



Per prudenza, consultare in ogni caso il medico o il farmacista prima di assumere il medicinale durante la gravidanza e l'allattamento.

Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco contiene sorbitolo

Se le è stata diagnosticata un'intolleranza a determinati zuccheri, assuma Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco solo dopo aver consultato il medico.

I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono assumere Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco.

Avvertenza per i diabetici

1 pastiglia contiene 0,86 g di sorbitolo (una fonte di 0,22 g di fruttosio), equivalenti a circa 0,07 unità pane (UP). Il sorbitolo può avere un lieve effetto lassativo.

3. Come prendere Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è

Lasci sciogliere lentamente in bocca 1 - 2 pastiglie più volte al giorno, ogni 2 - 3 ore, secondo necessità. Proseguo il trattamento per un giorno dopo la scomparsa dei disturbi.

Se prende più Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco di quanto deve

In caso di uso corretto, un avvelenamento con Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco può essere escluso e non è mai stato segnalato.

Se si assume un numero molto elevato di compresse possono manifestarsi disturbi gastrointestinali e, soprattutto nei bambini, si può osservare un aumento della metaemoglobina nel sangue. I sintomi che possono comparire comprendono affanno e colorazione bluastra delle labbra e delle dita.

Se sospetta un sovradosaggio marcato, informi un medico.

Come rimedio, il medico consiglierà la somministrazione di abbondante acqua e compresse di carbone vegetale, ed eventualmente altre misure contro la metaemoglobinemia.

Se dimentica di prendere Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Prenda subito 1 Dorithricin® pastiglia per la gola frutti di bosco e prosegua il trattamento con la posologia abituale.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

In base alla frequenza di comparsa, gli effetti indesiderati vengono classificati come segue:

- Molto comune: più di 1 persona trattata su 10
- Comune: da 1 a 10 persone trattate su 100
- Non comune: da 1 a 10 persone trattate su 1.000
- Raro: da 1 a 10 persone trattate su 10.000
- Molto raro: meno di 1 persona trattata su 10.000
- Non nota: la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili.

Possibili effetti indesiderati

Raro:

In casi rari possono manifestarsi reazioni di ipersensibilità, in particolare bei confronti di un prodotto del metabolismo della benzocaina (estere dell'acido aminobenzoico).

In caso di uso esterno è stato osservato un aumento della metaemoglobina nel sangue, in particolare nei bambini e in caso di applicazione su ferite estese. I sintomi che possono comparire comprendono affanno e colorazione bluastra delle labbra e delle dita.

Frequenza non nota:

Nelle persone predisposte possono comparire reazioni allergiche causate da sostanze chimicamente simile alla benzocaina, come le penicilline, le sulfonamidi, i prodotti solari e l'acido p-aminosalicilico (sensibilizzazione crociata a sostanze del gruppo para).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite la scheda per la comunicazione di effetti indesiderati dei farmaci (<http://www.bfarm.de>).



Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sul confezionamento primario dopo "Verwendbar bis:". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Condizioni di conservazione:

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco

- I principi attivi sono:
1 pastiglia contiene:

Tirotricina	0,5 mg
Benzalconio cloruro	1,0 mg
Benzocaina	1,5 mg
- Gli altri componenti sono:
Sorbitolo (Ph. Eur.), talco, saccarosio stearato tipo III, saccarina sodica 2 H₂O, aroma, povidone (K 25),
carmellosa sodica (Ph. Eur.)

Descrizione dell'aspetto di Dorithricin® pastiglie per la gola frutti di bosco e contenuto della confezione

Comprese rotonde di colore rosa

Confezioni da 20 pastiglie e 40 pastiglie

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

MEDICE Pharma GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

Telefon: (02371) 152790

Telefax: (02371) 937-329

e-Mail: info@medice-pharma.de

Produttore e co-distributore

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

Telefon: (02371) 937-0

Telefax: (02371) 937-329

e-Mail: info@medice.de

www.medice.de

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato nel maggio 2014.

Traduzione non ufficiale del foglietto illustrativo tedesco.

