

Dorithricin®

Boğaz Tableti Yaban Mersini



Kullanma Talimatı: Kullanıcılar için bilgiler

Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini 0,5 mg / 1,0 mg / 1,5 mg pastil

Etkin maddeler: tirotrisin / benzalkonyum klorür / benzokain

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce ambalaj prospektüsünün tümünü dikkatlice okuyunuz, çünkü önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı daima aynen ambalaj prospektüsünde belirtildiği gibi ya da aynen doktorunuzun veya eczacınızın talimatlarına göre uygulayınız.

- Ambalaj prospektüsünü saklayınız. Belki onu daha sonra tekrar okumak isteyebilirsiniz.
- Daha fazla bilgiye veya bir tavsiyeye ihtiyacınız olursa, eczacınıza sorunuz.
- Eğer yan etkiler fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu ambalaj prospektüsünde belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Bakınız Bölüm 4.
- Eğer 2 gün sonra kendinizi iyi hissetmezseniz ya da hatta daha kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Bu ambalaj prospektüsünün içeriği

1. Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini nedir ve ne için kullanılır?
2. Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini'ni kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
3. Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nelerdir?
5. Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini nasıl saklanır?
6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

1. Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini nedir ve ne için kullanılır?

Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini boğaz ve yutak tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Uygulama alanı

Boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü eşliğinde seyreden ağız ve yutak bölgesi enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi.

2. Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini'ni kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini'ni aşağıdaki durumlarda kullanmayınız

- eğer tirotrisin, benzalkonyum klorür, benzokain veya Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini'nin Bölüm 6'da belirtilen diğer bileşenlerinden birine karşı alerjiniz varsa, kullanmayınız.

Uyarı bilgileri ve koruyucu önlemler

Yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı veya kusma eşliğinde seyreden ağır boğaz iltihaplarında veya boğaz ağrılarında bir doktora danışmalısınız.

Doktorunuz özellikle ateşli ve cerahatli bir bademcik iltihabında, örneğin antibiyotik tedavisi gibi diğer tedavi önlemlerinin yanı sıra Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini'ni de uygulayıp uygulamayacağınıza karar verecektir.

Ağız ve yutak bölgesinde taze yaralar olması durumunda Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini kullanımından kaçınılmalıdır.

Ciltte aşırı duyarlılık (alerjik temas egzaması) eğilimi olan hastalar Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini kullanımından kaçınılmalıdır, çünkü ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarına yol açabilir.

Çocuklar

Bebeklerin ve küçük çocukların ilacı gerektiği gibi kullanması (emerek ağızda eritme) garanti edilemeyeceğinden, Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini'nin bebeklerde ve 24 ayın altındaki küçük çocuklarda kullanılması uygun değildir.

Çocuklarda uygulanırken, çocuğun pastili kontrollü bir şekilde emerek ağızda eritme yeteneğini kazanmış olduğuna dikkat edilmelidir.

Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini'nin diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer başka ilaçlar alıyorsanız, ya da kısa bir süre önce başka ilaçlar aldıysanız, ya da başka ilaçlar almak niyetindeyseniz, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirin.



Şu ana kadar, amaca uygun bir şekilde kullanıldığında diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşimi bilinmemektedir.

Hamilelik ve emzirme dönemi

Şu ana kadar Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini'nin teratojenik etkisi olduğuna dair bir bilgi yoktur. Yine de, hamilelik ve emzirme dönemlerinde ilacı kullanmadan önce ihtiyaten doktorunuza veya eczacınıza danışmakta yarar vardır.

Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini sorbitol içerir

Eğer belli şekere karşı toleranssızlık şikayetiniz olduğuna biliyorsanız, lütfen Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini almadan önce doktorunuza danışınız.

Nadir görülen kalıtsal fruktoz intoleransından şikayetçi olan hastalar Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini almamalıdır.

Diyabetliler için bilgiler

1 pastil, yaklaşık 0,07 ekmek birimine (EB) denk gelen 0,86 g sorbitol (0,22 g fruktoz oluşturur) içerir. Sorbitol hafif bir müshil etkisi gösterebilir.

3. Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini nasıl kullanılır?

Bu ilacı daima aynen ambalaj prospektüsünde belirtildiği gibi ya da aynen doktorunuzla veya eczacınızla kararlaştırdığınız şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önerilen doz

İhtiyaca göre günde birkaç defa, 2 - 3 saatte bir 1 - 2 pastili yavaş yavaş ağzınızda eritin.

Şikayetler sona erdikten sonra tedaviye bir gün daha devam edilmelidir.

Kullanmanız gerektiğinden daha fazla miktarda Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini almışsanız

Gerektiği gibi kullanıldığında, Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini ile zehirlenmek söz konusu olmayıp, şimdiye kadar da böyle bir olay bildirilmemiştir.

Çok fazla sayıda tablet alınması durumunda mide-bağırsak şikayetleri ve, özellikle çocuklarda olmak üzere, kanda artan miktarda methemoglobin görülebilir. Bunun olası belirtileri nefes darlığı ve dudakların ve parmakların morarmasıdır.

Önemli ölçüde bir doz aşımı şüphesi varsa, lütfen bir doktora haber veriniz.

Karşı önlem olarak bol su içilmesi ve kömür tableti alınması, ve duruma göre doktor tarafından methemoglobinemiye karşı alınacak önlemler önerilmektedir.

Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini almayı unutursanız

Bir önceki ilaç alımını atladıysanız, çift miktarda ilaç almayın.

Hemen 1 adet Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini pastilini ağzınızda eriterek alın ve ardından her zamanki dozunuzla devam edin.

4. Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi bu ilacın da yan etkileri olabilir, ancak bunların herkeste ortaya çıkması şart değildir.

Yan etkilerin değerlendirilmesinde şu sıklık kriterleri temel alınmaktadır:

- Çok yaygın: tedavi edilen her 10 kişide birden fazla
- Yaygın: tedavi edilen her 100 kişide 1 ila 10 arasında
- Yaygın olmayan: tedavi edilen her 1.000 kişide 1 ila 10 arasında
- Nadir: tedavi edilen her 10.000 kişide 1 ila 10 arasında
- Çok nadir: tedavi edilen her 10.000 kişide birden az
- Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle yaygınlık konusunda bir tahminde bulunmak mümkün değil.

Olası yan etkiler

Nadir:

Nadir olarak, başta benzokainin bir yıkım ürünü olan aminobenzoik asit estere karşı olmak üzere, aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir.

Dıştan uygulamalarda, özellikle çocuklarda ve büyük yara yüzeylerine sürüldüğünde, kanda methemoglobin düzeyinde artış görülmüştür. Bunun olası belirtileri nefes darlığı ve dudakların ve parmakların morarmasıdır.

Yaygınlığı bilinmiyor:

Duyarlı hastalarda, penisilinler, sülfonamidler, güneşten koruyucu kozmetikler, p-amino salisilik asit gibi kimyasal açıdan benzokain ile benzeşen maddeler de alerjik reaksiyonlara yol açabilir (para grubu sensibilizasyonu)



Yan etki bildirimi

Eğer yan etkiler fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu ambalaj prospektüsünde belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir. Yan etkileri, arzu edilmeyen ilaç etkileri (UAW) formu aracılığıyla da doğrudan bildirebilirsiniz (<http://www.bfarm.de>).

Yan etkileri bildirerek bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlamış olursunuz.

5. Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini nasıl saklanır?

Bu ilacı çocukların görmeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Bu ilacı ambalaj kartonunun ve kabın üzerinde "Verwendbar bis:" olarak belirtilen tarihten sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününe denk gelir.

Saklama koşulları:

25 °C'nin üzerinde saklamayınız.

İlaçları kanalizasyona veya çöpe atarak gidermeyiniz. Kullanmadığınız ilaçları nasıl gidereceğinizi öğrenmek için eczacınıza danışınız. Böylece çevreyi korumaya katkıda bulunmuş olacaksınız.

6. Ambalaj içeriği ve diğer bilgiler

Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini neler içerir?

- Etkin maddeleri:
1 pastilin içeriği:
Tirotrisin 0,5 mg
Benzalkonyum klorür 1,0 mg
Benzokain 1,5 mg
- Yardımcı maddeler şunlardır:
Sorbitol (Ph. Eur.), talkum, sükroz stearat Tip III, sakkarin sodyum 2 H₂O, aroma maddesi, povidon (K 25), karmeloz sodyum (Ph. Eur.)

Dorithricin® Boğaz Tableti Yaban Mersini'nin görünüşü ve ambalajın içeriği:

Pembe renkli, yuvarlak tabletler

20 pastil ve 40 pastil içeren ambalajlar halinde

Ruhsat sahibi

MEDICE Pharma GmbH & Co. KG

Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn

Telefon: (02371) 152790

Faks: (02371) 937-329

E-posta: info@medice-pharma.de

Üretici ve eş pazarlayıcı

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn

Telefon: (02371) 937-0

Faks: (02371) 937-329

E-posta: info@medice.de

www.medice.de

Bu ambalaj prospektüsünün son olarak düzenlendiği tarih: Mayıs 2014.

Almanca dilindeki kullanma talimatının resmi olmayan tercümesi.

